
DE PRENATALE EPOCH EN DAARNA⁸

Chris Stubbs

Chris Stubbs woont in Wirral, Engeland. De Wirral is een schiereiland ten zuiden van Liverpool. (Red.)

Samenvatting

In mijn vorige artikel heb gepoogd aannemelijk te maken, dat er voor ieder van ons een ideaal moment is om te worden geboren. Als we nu moderne medische kennis combineren met de prenatale epoch, zullen we in dit artikel speculatieve geboortetijden bepalen voor twee meisjes die geboren zijn door middel van een geplande keizersnede.⁸ De procedure wordt in detail beschreven in de appendix, en in stappen samengevat in tekst. Als het geslacht van de positie van de Maan bij epoch tegengesteld is aan dat van de nog ongebooren baby, zijn er, verrassend genoeg, slechts een paar mogelijke geboortetijden waaruit kan worden gekozen. Dit is een gevolg van de regels van de prenatale epoch.⁸ Aspecten naar elke radix-Maan maken dan de keuze van het ideale geboortetijdstip mogelijk.

Een ideale tijd om geboren te worden

Als aanstaande vader van twee baby's, elk onafhankelijk van elkaar geboren via een noodzakelijke geplande keizersnede, stond mij de gedachte tegen dat zij geboren zouden worden zonder enige kennis van hun natuurlijke geboortetijd.¹ Dat zou betekenen dat hen beiden een betrouwbare geboortehoroscoop zou worden onthouden, die zo belangrijk is voor ouders als een waardevolle gids gedurende hun ontwikkeling in de jeugd.² Natuurlijk zou het tijdstip van hun keizersneden bekend zijn, maar voor mij zou dit niet aanvaardbaar zijn om een geldige geboortehoroscoop op te baseren. Dit in tegenstelling tot de algemeen aanvaarde opvatting dat ons onafhankelijk bestaan begint met de eerste ademhaling.³ Mijn geloof in natuurlijke geboortetijden komt deels voort uit het lezen van Gauquelin's werk over de geboortehoroscopen van ouders en hun kinderen, maar vooral uit de eerste paar zeer belangrijke 'genetische' stappen van het proces van geboorte.^{4,5} Addey stelde dat we niet alleen onze fysieke vorm ontleen aan onze genen, maar ook ons karakter.⁶ De interpretatie van onze horoscoop, getrokken voor de tijd, datum en plaats van onze geboorte, beschrijft eveneens ons karakter.

Als we Addey's stelling aannemen, dan moet dat betekenen dat er voor elk van ons een natuurlijke of "ideale" tijd is om te worden geboren.⁷

Was er iets wat we hadden kunnen doen om de ideale geboortetijd van de twee meisjes te achterhalen? Mijn enige hoop was gevestigd op de prenatale epoch.⁸ Daarvoor zou het nodig zijn om het tijdstip van de epoch (of van het moment van bevruchting) te bepalen en daaruit een ideale geboortetijd af te leiden.⁷

De stand van de medische wetenschap

Gelukkig stelt nieuwe medische kennis ons in staat, veel beter dan in de tijd van Bailey, begrip te krijgen van de gebeurtenissen die voorafgaan aan de conceptie.⁹ ⁸ Bijvoorbeeld weten we nu dat de meeste vrouwen vruchtbaar zijn ongeveer twee weken voor het begin van hun volgende menstruatie.¹⁰ Bovendien weten we dat de gemiddelde tijd van inseminatie tot bevruchting zeven uur is, met een ruime spreiding, en dat de conceptie ongeveer drie tot vier dagen later plaatsvindt.¹¹ Met dit in gedachte, werden de tijdstippen van inseminatie van maand tot maand genoteerd, zodat we achteraf met enige zekerheid zouden weten welke inseminatie tot de conceptie zou hebben geleid.¹² Uit deze aantekeningen kunnen we op enkele uren nauwkeurig, het tijdstip van de bevruchting afleiden. Verder kennen we, drie maanden later, na geslachtsbepalend onderzoek (bijvoorbeeld vruchtwaterpunctie), het geslacht van de aanstaande baby.

Voor de epochfiguur (dat is de horoscoop gemaakt voor het moment van de bevruchting) weten we [zie de uitleg na dit artikel] dat:

- ♦ het geslacht van de baby zal het **geslacht** zijn dat hoort bij de positie van de Maan, wanneer de ascendant **negatief** is,
- ♦ het geslacht van de baby zal gelijk zijn aan dat van de positie van de Maan, wanneer het geslacht van Maan en ascendant gelijk zijn,
- ♦ het geslacht van de baby zal dat zijn van het **kwadrant** waar de Maan in staat, wanneer Maan en ascendant van verschillend geslacht zijn.⁸

Tabel 1: epochs in ochtend van 8 februari 1990 (wanneer de Zon staat op ongeveer 19° Aquarius), en de daarmee corresponderende speculatieve geboortegegevens

Epoch Nr	Tijd	Orde en type	Ascendant	Maan	Kwadrant van de Maan
1	00.21	1e orde/irregulier/2e variatie	17°47' Scorpio	26°52' Cancer	Vrouwelijk
2	00.25	4e orde/regulier	18°35' Scorpio	26°56' Cancer	Vrouwelijk
3	04.47	1e orde/irregulier/2e variatie	28°45' Capricornus	29°22' Cancer	Vrouwelijk
Radix Nr	Datum	Tijd	Ascendant	Maan	Zon
1	20-10-'90	11.57*	26°52' Capricornus	17°47' Scorpio	26°50' Libra
2	03-11-'90	11.02	26°56' Capricornus	18°35' Taurus	10°46' Scorpio
3	26-10-'90	11.42*	29°22' Capricornus	28°45' Capricornus	02°48' Scorpio

* de geldende zomertijd is hier niet meegenomen

Het eerste geval

Een succesvolle inseminatie vond plaats op 7 februari 1990 om 23.00 uur, op de Wirral, in Engeland, in lijn met het bovenstaande resulterend in de bevruchting enkele uren later, en in de conceptie een aantal dagen daarna. Drie maanden later wees een geslachtsbepaling uit dat de aanstaande baby een meisje was.¹⁴ In de appendix staat de procedure volgens welke de drie mogelijke epochhoroscopen zijn verkregen die worden beschreven in tabel 1. De figuren 1, 2 en 3 tonen de speculatieve geboortehoroscopen 1, 2 en 3, eveneens beschreven in tabel 1, die ons helpen de drie epochhoroscopen verder te onderzoeken. (zie boven)

Tabel 1 laat zien, dat hoewel de geboortedata verschillend zijn, de rijzende graden bij geboorte dicht bij elkaar liggen. Dit maakt, dat deze drie speculatieve horoscopen er enigszins hetzelfde uitzien. Dit is het gevolg van het feit dat de positie van de Maan op het epochmoment varieert binnen het interval van de drie mogelijke epochmomenten. Daarom zien we, dat wanneer het geslacht van de positie van de Maan op het epochmoment tegengesteld is aan dat van de aanstaande baby, er geen grote hoeveelheden acceptabele epochmomenten zijn die leiden tot een wirwar van speculatieve geboortetijden. Het zijn er eerder verbazingwekkend weinig. Dit komt, omdat de graad van de dierenriem die wordt bezet door de Maan van de epoch, het aantal mogelijkheden op elke potentiële geboortedag beperkt tot twee, dat wil zeggen wanneer deze graad hetzij opkomt, hetzij ondergaat.

Echter, de posities van de ascendant van de epoch, en daardoor ook de posities van de Maan van de geboorte, zijn aanzienlijk verschillend (zie de figuren 1, 2, en 3), met name wanneer de volgorde van de epochs verschillend is. Wanneer we proberen astrologisch te bepalen welke van deze epochs juist zou kunnen zijn, zullen we eerst de verschillen bekijken in de aspecten met de Maan, en vervolgens in de posities van de Maan bij geboorte. Omdat de eigenschappen die worden toegeschreven aan de Maan, in jonge kinderen sterk vertegenwoordigd zijn, zouden deze verschillen op jonge leeftijd duidelijk aan de dag moeten treden.¹⁹ Indien nodig zouden we dan de verschillen in de sterkte van de elementen en kruizen kunnen beschouwen bij geboorte, gevolgd door een vergelijking van de geboortehoroscopen met die van de ouders.^{20, 4} Uiteindelijk zouden we nog kunnen proberen fysiologische aanwijzingen te onderzoeken, om te kijken wanneer de geboorte zou hebben moeten plaatsvinden.

Tabel 2 (bovenaan de volgende pagina) stelt ons in staat de verschillen te vergelijken in de aspecten en positie van de Maan, voor deze drie gevallen.

Tabel 2 laat zien, dat de verschillen tussen de drie posities van de Maan, en de aspecten met de Maan, groot zijn, en tamelijk uitgesproken. Zo heeft de Maan in geval 1 geen majeure aspecten met de Zon, Mercurius en Venus, maar staat deze in een nauwe conjunctie met Pluto. De Maan in geval 3 heeft geen majeure aspecten met Jupiter, Saturnus, Neptunus en Pluto, maar staat conjunct met de ascendant. De Maan in geval 2 heeft aspecten met bijna alle planeten, in

Tabel 2: de positie van de Maan en haar aspecten in de speculatieve geboortehoroscopen 1, 2 en 3

Specul. Radix Nr	Teken Maan	Sector Maan	Aspecten van de Maan met										
			Zon	Mer	Ven	Mar	Jup	Sat	Ura	Nep	Plu	Asc	MC
1	Scorpio	11	-	-	-	-	☐ ^z	✕ ^s	-	-	♂ ^e	-	-
2	Taurus	5	♂ ^z	♂ ^e	♂ ^z	-	☐ ^z	△ ^s	-	△ ^z	♂ ^s	-	-
3	Capricornus	1	☐ ^m	☐ ^z	☐ ^{s-m}	☐ ^s	-	-	-	-	-	♂ ^e	☐ ^m

^e = exact, ^s = sterk, ^m = medium, ^z = zwak

het bijzonder nauwe opposities met Mercurius en Pluto. Mijn eigen ervaring en inzicht in de persoonlijkheid van mijn dochter brengen mij tot de conclusie dat de speculatieve geboortehoroscoop nummer 3 het best bij haar past.²⁰ De Maan op haar ascendant geeft haar het zachte karakter dat zij ongetwijfeld heeft. haar moeder heeft toevallig ook de Maan op de ascendant. Bovendien is dit de geboortehoroscoop waarvan de epoch de best passende tijd heeft tussen inseminatie en bevruchting, hoewel het beschikbare tijdsinterval klein is.

Overzicht van de werkwijze

We kunnen het hele proces van hetgeen we zojuist hebben beschreven stap voor stap als volgt samenvatten.

- Zoek het geslacht van de positie van de Maan rond de tijd van de bevruchting. Voorlopig, en omwille van de eenvoud, moet dit het tegengestelde zijn van dat van de aanstaande baby.
- Zoek vervolgens die tijdsperioden waarin zowel het geslacht van de positie van de ascendant en van het kwadrant waarin de Maan staat, hetzelfde zijn als dat van de aanstaande baby.
- Bepaal achtereenvolgens mogelijke geboortedata voor deze perioden door te kijken in de efemeris, en bepaal wanneer op deze data de lengtegraad van de epoch-Maan opkomt of ondergaat.
- Schrap vervolgens die gevallen waar de lengte van de geboorte-Maan in een negatief gebied valt. Bij een dergelijke geboorte-Maan kan geen epoch-ascendant voorkomen in een gebied wat tegengesteld kan zijn aan het geslacht van het gebied waar de epoch-Maan staat. Zie het voorbeeld hierna.
- Bepaal voor alle overige gevallen de **orde** van de epoch en de **indexdatum**, zodat die gevallen die op

basis van de indexdatum niet juist kunnen zijn kunnen worden geschrapt.

- Schrap vervolgens die gevallen die niet juist kunnen zijn omdat het geslacht van het kwadrant waarin de Maan staat, tegengesteld is aan dat van de aanstaande baby.
- Pas alle overblijvende epochs bij de bijbehorende speculatieve geboortetijden.
- Bereken de horoscopen en bepaal de meest waarschijnlijke, onder meer op grond van de verschillen in aspecten van de geboorte-Maan.

Het tweede geval

Het tweede geval verschaft ons meer duidelijkheid met betrekking tot dit gehele overzicht. Opnieuw vond een succesvolle inseminatie plaats, om 8.30 uur op 28 april 1986, op de Wirral, toen de Britse Zomertijd gold. Een echo niet lang voor de geboortevan de baby, wees uit dat de aanstaande baby een meisje was.²¹ In de appendix vindt u de werkwijze die leidde tot de drie mogelijke epochs. Tabel 3 geeft, net als tabel 1, een overzicht van de gegevens. (zie pagina 6 bovenaan)

Tabel 3 laat zien, dat hoewel de geboortedata verschillend zijn, de graden van de ascendant sterk overeenkomen, waardoor de drie speculatieve geboortehoroscopen er enigszins hetzelfde uitzien. De posities van de ascendant bij epoch, en dientengevolge ook de posities van de Maan bij geboorte, zijn echter sterk verschillend. Opnieuw zien we dat wanneer het geslacht van de positie van de epoch-Maan tegengesteld is aan dat van de aanstaande baby, er geen grote aantallen mogelijke epochs zijn, maar juist betrekkelijk weinig. Om via astrologische weg te beslissen welke van deze drie waarschijnlijk juist is, zullen we opnieuw de verschillen in de aspecten en de positie van de geboorte-Maan bekijken.




fig. 1: speculatieve geboorte-
horoscoop nr. 1 uit tabel 1

fig. 2: speculatieve geboorte-
horoscoop nr. 2 uit tabel 1





fig. 3: speculatieve geboorte-
horoscoop nr. 3 uit tabel 1

Deze figuren zijn berekend met Morinus-
sectoren en traditionele planeetposities.

Tabel 3: epochs in de ochtend van 28 april 1986 (wanneer de Zon rond 8° Taurus staat), voor de geboorte van een meisje, en de bijbehorende speculatieve geboortedata

Epoch Nr	Tijd*	Orde en type	Ascendant	Maan	Kwadrant van de Maan
1	09.12	3e orde/regulier	03°45' Gemini	00°45' Capricornus	Vrouwelijk
2	09.56	3e orde/regulier	15°44' Gemini	01°15' Capricornus	Vrouwelijk
3	10.38	3e orde/regulier	27°30' Gemini	01°45' Capricornus	Vrouwelijk
Specul. Radix Nr	Datum	Tijd	Ascendant	Maan	Zon
1	07-02-'87	03.10	00°45' Capricornus	03°45' Gemini	17°40' Aquarius
2	08-02-'87	03.06	01°15' Capricornus	15°44' Capricornus	18°40' Aquarius
3	09-02-'87	03.03	01°45' Capricornus	27°30' Gemini	19°40' Aquarius

* de geldende zomertijd is hier meegenomen

Tabel 4: de positie van de Maan en haar aspecten in de speculatieve geboortehoroscopen 1, 2 en 3 uit tabel 3

Specul. Radix Nr	Teken Maan	Sector Maan	Aspecten van de Maan met										
			Zon	Mer	Ven	Mar	Jup	Sat	Ura	Nep	Plu	Asc	MC
1	Gemini	6	-	☐ ^s	⋈ ^z	∠ ^s	-	-	-	-	-	-	△ ^m
2	Gemini	7 (net)	△ ^{s-m}	-	-	-	-	♂ ^m	-	-	-	-	-
3	Gemini	7	△ ^z	-	♂ ^z	-	☐ ^{s-m}	-	♂ ^s	-	☐ ^z	♂ ^m	☐ ^m

e = exact, ^s = sterk, ^m = medium, ^z = zwak

Tabel 4 helpt ons bij deze vergelijking. (zie hierboven) Tabel 4 laat opnieuw zien dat de aspecten van de Maan onderling aanzienlijk verschillen. In geval 1 heeft de Maan een sterk vierkantaspect met Mercurius. In geval 2 heeft de Maan een sterke driehoek met de Zon en een matig sterke oppositie met Saturnus. In geval 3 heeft de Maan een sterk vierkant met Jupiter en een sterke oppositie met Uranus. Ook hier weer leidde mijn ervaring en inzicht in de persoonlijkheid van mijn dochter mij tot de conclusie dat de duidingen voor geval 3 deze het best beschrijven.²⁰ De aspecten van Jupiter en Uranus met de Maan passen bijzonder goed bij haar karakter en haar gedrag.¹⁸ Bovendien is dit de geboortehoroscoop waarvan de epoch de het dichtst ligt bij de gemiddelde tijdsduur tussen inseminatie en bevruchting.

In de toekomst zouden we de voorgaande procedure kunnen uitbreiden naar het geval van jongens waarvan de geboortetijd onzeker is, en waarvan de

epoch-Maan in een gebied staat van het vrouwelijk geslacht. Dan zouden we vervolgens misschien moeten proberen de methode uit te breiden naar alle baby's met onzekere geboortetijden, ongeacht geslacht of positie van de epoch-Maan.

Normaal wordt de geboorte verwacht rond 40 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie. Voor ongeveer de helft van de geboorten met geplande keizersnede zouden we met de hier beschreven methode in staat moeten zijn nauwkeuriger in te schatten wanneer de natuurlijke geboorte waarschijnlijk zou hebben plaatsgehad, vooropgesteld dat we inderdaad de vermoedelijke tijd van bevruchting kunnen achterhalen. Dit zou onnodig haastige beslissingen in verband met keizersneden kunnen voorkomen, wanneer er aanwijzingen zijn voor een aanzienlijk kortere zwangerschap dan gemiddeld. ■

Appendix

Het eerste geval

We beginnen 8 februari om middernacht (0 uur), toen de Maan 26°42' Cancer stond, en om 12 uur in de middag stond op 3°25' Leo. In Bailey's "Table of Sex Degrees" zien we dat voor de inseminatie, en de twee daaropvolgende dagen, de Maan in een mannelijk gebied stond. Dit betekent dat niet alleen de ascendant in een vrouwelijk gebied moet staan, maar ook dat de Maan in een vrouwelijk kwadrant moet staan. De Morinus-ascendant om middernacht (0 uur) op 8 februari 1990 op de Wirral, was 12°30' Scorpio, een mannelijke positie.¹³ De ascendant ligt in een vrouwelijk gebied tussen 17°09' en 25°43' Scorpio, dat wil zeggen tussen 00.11 uur en 00.52 uur op die dag. Op het exacte geslachtspunt (21°26' Scorpio ascendant) is de positie van de Maan 27° Cancer. Dat betekent dat op de beoogde geboortedatum de Maan ongeveer 21°30' Scorpio (of Taurus) staat, met een ascendant van 27° Cancer (of Capricornus). Volgens de eferis zijn mogelijke data ter overweging: 20 oktober, 3 november en 17 november 1990.^{15, 16}

Voor 20 oktober vinden we 27° Cancer op de ascendant, de Maan staat onder de aarde en is wassend, zodat de orde van de epoch 3 is. Omdat de indexdatum 21 januari is, kan deze datum niet juist zijn, want de epoch moet *voor* 21 januari vallen, en kan dus niet op 8 februari zijn. Als 27° Capricornus op 20 oktober op de ascendant staat, staat de Maan boven de aarde en is wassend, zodat de orde van de epoch 1 is. Zowel Maan als ascendant vallen in een vrouwelijk gebied. De indexdatum is 21 januari, en daarom hebben we een 2e variatie epoch nodig om een epoch te verkrijgen op 8 februari. De Maan moet hier in een vrouwelijk kwadrant liggen, en dat is inderdaad het geval. Dus 27° Capricornus rijzend op 20 oktober 1990 levert ons een mogelijke geboortedatum en -tijd voor een meisje.¹⁷

Vervolgens kijken we naar 3 november 1990, als de Maan in de middag 21°26' Taurus staat. Om 23.01 uur staat is 27° Cancer ascendant op deze datum. Op dat moment staat de Maan 26°09' Taurus, wat net buiten het toegestane gebied ligt. Bovendien staat de Maan boven de aarde en is afnemend, zodat de orde van de epoch 2 is. De indexdatum is 3 februari 1990, en dat kan geen 2e orde epoch opleveren op de latere datum 8 februari.

Op 3 november 1990 staat om 11.02 uur 27° Capricornus op de ascendant. Op dat moment staat de Maan op 18°36' Taurus. De Maan staat onder de aarde en is afnemend, zodat de orde van de epoch 4 is. Omdat de indexdatum 3 februari is kunnen we een epoch hebben op 8 februari daarna. Als 18°34' Scorpio op de ascendant staat op 8 februari 1990, zie we dat de Maan op 26°50' Cancer staat. De ascendant is vrouwelijk, de Maan mannelijk, en de Maan staat in een vrouwelijk kwadrant. Hiermee hebben we een geldige epoch gevonden voor de geboorte van een meisje om 11.02 uur op 3 november 1990 op de Wirral.

Vervolgens bekijken we de mogelijkheden op 17 november 1990. Op die dag staat de Maan op 21°26' Scorpio in de

vroege ochtend. Op 16 november om 22.09 uur hebben we 27° Cancer ascendant, en de Maan staat op dat moment op 19°18' Scorpio. De Maan staat dan onder de aarde en is afnemend, zodat de orde van de epoch 4 is. De indexdatum is 17 februari 1990. Dit betekent dat de epoch moet vallen *na* 17 februari 1990, dus deze mogelijke geboortedatum is niet juist. Op 17 november 1990 om 10.07 uur hebben we 27° Capricornus ascendant, en de Maan staat op dat moment op 25°17' Scorpio. De Maan staat boven de aarde en is toenemend, zodat de orde van de epoch 1 is. Omdat de indexdatum 17 februari 1990 is, betekent dat opnieuw dat de epoch moet vallen *na* 17 februari, dus deze mogelijke geboortedatum is wederom onjuist. Andere posities van de Maan rond deze tijd vallen buiten het toegestane vrouwelijke gebied (17°09' - 25°43' Scorpio).

Op 8 februari 1990 (de dag van de epoch) gaat de ascendant opnieuw het vrouwelijke gebied in op 21°26' Capricornus, en wel om 4.20 uur. Op dat moment is de positie van de Maan 29°08' Cancer. Een blik in de eferis laat zien dat mogelijke data voor een meisje zijn: 26 oktober (eind 25?), 8 november en 22 november.¹⁴ Voortgaande op precies dezelfde manier als zojuist beschreven, vinden we dat er geen geschikte geboortedatum mogelijk is op 25 oktober. De indexdatum valt op 25 januari, en omdat de orde van de epoch 3 is, zou de geboorte *voor* die datum moeten plaatsvinden, en dat is dus niet op 8 februari. Echter, een interessante situatie ontstaat, wanneer op 26 oktober om 11.34 uur 29°08' Capricornus op de ascendant staat. Op dat moment staat de Maan op 28°41' Capricornus, bijzonder dicht bij de ascendant. Omdat de Maan (net) boven de aarde staat en wassend is, is de orde van de epoch 1. De indexdatum is 26 januari, dus dit moet een geval zijn waarbij de Maan op de ascendant komt en doorgaat naar de descendant om uit te komen op een epoch op 8 februari. In dat geval moeten we de regels volgen voor een irreguliere epoch, 2e variatie. Op 8 februari om 4.45 uur staat 28°41' Capricornus op de ascendant. Op dat moment staat de Maan op 29°23' Cancer. De Maan is dan mannelijk en de ascendant vrouwelijk, en de Maan staat net in een vrouwelijk kwadrant. Hier hebben we dus een mogelijke tijd voor de aanstaande geboorte van een meisje.

Bekijken we de mogelijke geboorte van een meisje op 8 november 1990, dan vinden we dat de epoch hetzij moet vallen *voor* de indexdatum van 7 februari, hetzij 28 dagen *voor* de indexdatum. Evenzo geldt voor de geboorte van een meisje op 22 november 1990, dat juiste epochs in ieder geval moeten vallen *na* de indexdatum van 22 februari.

Meteen na 4.45 uur op 8 februari zien we dat de Maan ongeveer 7 uur lang in een mannelijk kwadrant staat, waardoor is uitgesloten dat er epochs zouden zijn die passen bij de geboorte van een meisje. Het volgende moment waarop ascendant en het kwadrant waar de Maan in staat, beide vrouwelijk zijn, is bij ascendant 4°17' Taurus op 8 februari om 11.25 uur op de Wirral. Dit is echter meer dan 12 uur na inseminatie en dat is dus waarschijnlijk al voorbij de bevruchting. Dus voor de geboorte van een meisje ongeveer 9 maanden later blijven over de drie epochs die we al hadden gevonden.

Het tweede geval

Als we te werk gaan volgens het stapgewijze overzicht, zien we in Bailey's "Table of Sex Degrees", dat het gebied waarin de Maan staat bij epoch, en, voor die gehele dag, mannelijk was. Opnieuw moet niet alleen de ascendant in een vrouwelijk gebied staan bij epoch, maar ook moet de Maan in een vrouwelijk kwadrant staan. De ascendant gaat een vrouwelijk gebied binnen wanneer 0°00' Gemini op de ascendant staat op 28 april 1986. De Maan gaat een mannelijk kwadrant binnen wanneer de ascendant 2° Cancer staat. Er is dus een periode van twee uur, beginnend om 8.55 uur, gedurende welke een epoch voor de geboorte van een meisje mogelijk is. De volgende keer dat zowel het gebied waarin de ascendant staat als het kwadrant waarin de Maan staat vrouwelijk zijn, is wanneer de ascendant 8°34' Libra is, om 17.25 uur op die dag. Dit is bijna 9 uur na de inseminatie. Daarom kunnen we redelijkerwijs onze aandacht beperken tot de periode van twee uur tussen 8.55 en 10.55 op de dag van de epoch. Tijdens deze periode staat de Maan ongeveer op 1,25° Capricornus. Dat betekent dat op een toekomstige geboortedatum, de Maan ergens tussen 0° Gemini en 2° Cancer (of tussen 0° Sagittarius en 2° Capricornus) zal staan, en de ascendant 1°15' Capricornus (of 1°15' Cancer) zal zijn. In de efemeris zien we dat mogelijk geboortedata zijn: 10-13 januari (voor de geboorte door keizersnede!), 25-27 januari, en 7-9 februari 1986.^{15,22}

Verrassend genoeg is er geen enkele geschikte geboortetijd te vinden tussen 25 en 27 januari. Dit komt enerzijds doordat de epoch van de tweede orde is, en daarom voor 28 april 1986 moet plaatsvinden, en anderzijds wanneer de epoch van de vierde orde is valt de Maan in een negatief gebied en kan daarom niet de epoch voor de geboorte van een meisje opleveren.

De drie mogelijke geboortetijden met 1°15' Cancer ascendant op 7, 8 en 9 februari leiden tot eerste orde epochs, die moeten vallen na de indexdatum van 10 mei 1986. De drie mogelijke geboortetijden met 1°15' Capricornus ascendant op deze data leiden tot derde orde epochs, met drie juiste epochs voor de geboorte van een meisje op de vereiste datum van 28 april 1986. Nota bene, opnieuw houden we slechts drie mogelijke speculatieve geboortetijden over.

Noten

1. Al voor de poging tot het krijgen van een kind was bekend dat, als gevolg van de leeftijd van de moeder, dit bij beide kinderen nodig zou zijn.
2. J. Mayo, *Astrology*, Teach Yourself Books, Hodder and Staughton, London, 1980, Introduction
3. G. Dean and A. Mather, *Recent Advances in Natal Astrology*, The Astrological Association, Bromley, 1977, p. 465 - 471
4. M. Gauquelin, *Planetary Heredity*, A.C.S. Publications, San Diego, U.S.A., 1988, p. 14
5. C. Stubbs, *Pre-Natal Moments for Potential Planetary Selection*, The Astrological Journal, Sept/Oct. 1990, Letters to the Editor

6. J. M. Addey, *Harmonics in Astrology*, L. N. Fowler & Co. Ltd., Romford, 1976, Ch. 20, p. 205 - 218
7. C. Stubbs, *Our Birth on Earth*, Astrology Quarterly, 64 (4), 27 (1994)
8. E. H. Bailey, *The Pre-Natal Epoch*, Samuel Weiser, New York, 1974
9. C. Stubbs, *The Scientific Truth of Natal Astrology*, *Urania*, 98 (3) 30, (2004)
10. Pregnancy Book, *Health Education Council*, London, 1984, p. 4
11. M. Levitan and A. Montagu, *Textbook of Human Genetics*, Oxford University Press, 1971, Chs. 1 and 2.
12. Eigenlijk kunstmatige inseminatie door de echtgenoot. In dit geval is de tijd van inseminatie tot bevruchting waarschijnlijk korter dan normaal.²³
13. Ze werd geboren via een keizersnede om 11.15 uur op 18 oktober 1990 op de Wirral, in Engeland.
14. In dit artikel wordt steeds gebruikgemaakt van de Morinus-ascendant (het Morin-punt).
15. Neil F. Michelson, *The American Ephemeris for the 20th. Century*, 1900 - 2000 at Midnight, Astro Computing Services, San Diego, USA, 1980
16. Op 21 oktober valt de positie van de Maan buiten het toegestane gebied. (17°09' - 25°43' Scorpio)
17. Dit is onwaarschijnlijk, omdat de data zo dicht bij de datum van de geboorte (via keizersnede) liggen.
18. M. E. Hone, *The Modern Textbook of Astrology*, L. N. Fowler, Romford, Rev. Ed., 1978, p. 25 - 26
19. R. Hand, *Planets in Youth*, Whitford Press, Pennsylvania, U.S.A., 1977, p. 103 - 142
20. Ik heb geen poging gedaan dit te verifiëren door middel van directies.
21. Ze werd geboren via een keizersnede om 10.42 uur op 15 januari 1987, op de Wirral, in Engeland.
22. Er zijn drie juiste mogelijke geboortetijden voor een meisje op 10-12 januari 1987, als ongeveer 1°15' Cancer op de ascendant staat. Alle epochs zijn eerste orde, irregulier, tweede variatie. Als ongeveer 1°15' Capricornus op de ascendant staat op 11-13 januari, zijn alle epochs derde orde, en vallen voor de indexdata van 13-15 april 1986.
23. Er is geen rekening gehouden met het verschijnsel van "sperma-capacitatie". Er is aangenomen, misschien ten onrechte, dat de periodes van inseminatie tot bevruchting die in dit artikel worden genoemd lang genoeg zijn om deze te bewerkstelligen.

KORTE TOELICHTING OP “DE PRENATALE EPOCH EN DAARNA”

Ingmar de Boer

De Regel van Hermes is een kosmisch verband tussen bevruchting (**epoch**) en geboorte. Rekenkundig is dit verband gebaseerd op de verhouding tussen de lengte van een maand en de lengte van een dag. De omlooptijd van de Maan ten opzichte van de sterrenhemel, en de rotatie van de Aarde ten opzichte van de sterrenhemel verhouden zich zo, dat na exact 10 Maan-maanden er vrij exact 274 sterrendagen zijn verstreken, en dat is ongeveer gelijk aan de gemiddelde lengte van de zwangerschap. De siderische maand duurt 27^d,3216 en de sterrendag 24^h03^m04^s in middelbare zonnetijd.

Tijdens die gemiddelde zwangerschap gaat de Maan dus precies 10 maal rond in de dierenriem, en het horoscoopframe draait in die periode 274 maal rond. Dat wil zeggen dat we in dit bijzondere geval bij geboorte dezelfde Maan-stand en dezelfde ascendant zouden hebben als bij epoch. De datum die precies 10 Maan-maanden voor de geboorte ligt, wordt genoemd de **indexdatum**.

In werkelijkheid duurt de zwangerschap natuurlijk niet altijd precies 10 Maan-maanden, de Regel van Hermes geeft dan aan of, en hoeveel dagen ongeveer, de zwangerschap langer of korter duurt, dat wil zeggen of de epoch valt voor of na de indexdatum. Daarbij hebben we te maken met 4 combinaties, die worden genoemd de **4 orden** van epochs.

Maan Radix		Wassend		Afnemend	
Maan Radix	Boven de horizon	Orde 1:	zwangerschap korter dan 10 maanmaanden	Orde 2:	Zwangerschap langer dan 10 maanmaanden
	Onder de horizon	Orde 3:	zwangerschap langer dan 10 maanmaanden	Orde 4:	zwangerschap korter dan 10 maanmaanden

fig. 1: de vier orden van epochs

De Regel van Hermes zoals die in de antieke literatuur wordt geformuleerd, luidt dan, dat de positie

van de Maan bij epoch, de ascendant of descendant bij geboorte wordt. Wanneer de Maan bij geboorte wassend is, zou de epoch-Maan de ascendant bij geboorte worden, en wanneer deze afnemend is de descendant. Deze regel berust ongetwijfeld op een esoterische duiding van rekenkundige verbanden. Als we de regel nog iets korter willen formuleren, kunnen we zeggen: wanneer in de radix het pars onder de horizon staat, is de ascendant gelijk aan de Maan van de epoch, en anders is de descendant gelijk aan de Maan van de epoch .




fig. 2: de Regel van Hermes

In het begin van de 20e eeuw is het de Engelse astroloog E.H. Bailey geweest die in zijn de boek *The Prenatal Epoch* een uitwerking gaf van het gebruik van de epoch-horoscoop, onder meer voor de bepaling van het geslacht van de aanstaande baby.¹ De regels die Bailey hiervoor gebruikt zijn afkomstig uit de Indiase astrologie. Het zijn met name deze regels die Chris Stubbs gebruikt in zijn artikel *De prenatale epoch en daarna* om het “ideale geboortemoment” te bepalen.² Daarbij spelen een aantal specifieke begrippen een rol die wellicht enige toelichting behoeven, zoals het geslacht van de positie van een hemellichaam, het negatief zijn van de positie

van een hemellichaam, en het geslacht van een kwadrant. In het kader van een toelichting op het artikel van Stubbs hoeven we hier niet uit te weiden over de betekenis van die begrippen, maar we kunnen proberen te bekijken hoe ze praktisch worden toegepast, zoals Bailey ook doet in hoofdstuk 5 van zijn boek.

Allereerst worden in de dierenriem op een bepaalde wijze punten aangegeven die mannelijk of vrouwelijk zouden zijn, door Bailey genoemd "Sex degrees", oftewel geslachtsgraden. De orb voor de Maan voor een samenstand met een geslachtsgraad is volgens Bailey 6°26'. Voor de ascendant is de orb 4°17'. Op deze manier heeft door samenstand met een geslachtsgraad de Maan altijd hetzij mannelijk, hetzij vrouwelijk **geslacht**. De ascendant daarentegen kan ook buiten de gestelde orb vallen, en kan dus geslachtsloos oftewel **negatief** zijn. Figuur 3 geeft de tabel waaruit voor Maan en ascendant het geslacht kan worden bepaald.

TABLE III.

Sex.	Limits of		Exact Sex Point.	Limits of	
	Moon's Orb.	Ascend't's Orb.		Ascend't's Orb.	Moon's Orb.
F	---	---	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 6.26
M	♄ 6.26	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 19.17
M	♄ 19.17	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 2. 9
F	♄ 2. 9	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 15. 0
M	♄ 15. 0	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 27.51
F	♄ 27.51	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 10.43
F	♄ 10.43	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 23.34
F	♄ 23.34	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 6.26
F	♄ 6.26	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 19.17
M	♄ 19.17	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 2. 9
M	♄ 2. 9	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 15. 0
M	♄ 15. 0	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 27.51
M	♄ 27.51	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 10.43
F	♄ 10.43	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 23.34
M	♄ 23.34	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 6.26
F	♄ 6.26	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 19.17
F	♄ 19.17	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 2. 9
M	♄ 2. 9	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 15. 0
F	♄ 15. 0	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 27.51
M	♄ 27.51	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 10.43
M	♄ 10.43	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 23.34
M	♄ 23.34	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 6.26
F	♄ 6.26	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 19.17
F	♄ 19.17	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 0. 0	♄ 2. 9
M	♄ 2. 9	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 12.51	♄ 15. 0
F	♄ 15. 0	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 25.43	♄ 27.51
M	♄ 27.51	♄ 0. 0	♄ 4.17	♄ 8.34	♄ 10.43
M	♄ 10.43	♄ 12.51	♄ 17. 9	♄ 21.26	♄ 23.34
F	♄ 23.34	♄ 25.43	♄ 30. 0	---	---

EXPLANATION.—Column 4 of the table shows the exact sex point. Cols 3 and 5 show where the influence of the ascendant commences and finishes respectively. Cols. 2 and 6 show where the moon's influence commences and finishes respectively. Col. 1 gives the sex of the area between the longitudes in Cols. 2 and 6.

EXAMPLE.—Ascendant at epoch, Cancer 18° 5'. Moon, Scorpio 15° 24'. Looking down the columns headed "Ascendant's Orb," it will be seen that Cancer 18° 5' is outside the limits given. It is, therefore, negative. Looking down the columns headed "Moon's Orb," it will be seen that Scorpio 15° commences a male area, and the moon will therefore be in an area of that sex. The same rule applies to all cases.

fig.3: tabel van geslachtspunten volgens Bailey

Voor de vier **kwadranten** geldt, dat het eerste vrouwelijk is, het tweede mannelijk, het derde weer vrouwelijk en het vierde weer mannelijk.




fig. 4: het geslacht van de vier kwadranten volgens Bailey

Verder zijn er nog een aantal termen rond de epoch-horoscoop die verwarrend kunnen zijn, zoals de biologische termen inseminatie (coïtus), bevruchting (amfimixis), conceptie, en de astronomische term epoch. Het moment waarvoor we een horoscoop willen maken, is het ontstaan van de kiem van de nieuwe mens uit het genetisch materiaal van de beide ouders, dus het moment van de bevruchting, oftewel het moment van ontstaan van het fysiek lichaam. De term conceptie-horoscoop is dus strict genomen niet juist. Het begrip conceptie duidt immers op het begin van de zwangerschap, wanneer de bevruchte eicel zich begint in te nestelen in de baarmoederwand. De coïtus, de bevruchting en de innesteling zijn dus drie achtereenvolgende, verschillende momenten. Het astronomische begrip epoch (Gr. ἡ ἐποχή) betekent in dit verband niet tijdvak, maar referentiepunt in de tijd. Dat duidt dus op een algemeen beginpunt, dat wil zeggen op het moment van de bevruchting. Daarom spreken we hier dus van een epoch-horoscoop.

Uiteraard is het boek van Bailey een mogelijkheid tot verdere studie. Een boekje uit onze eigen kring, of althans die van het vroegere NAG, is *De Regel van Hermes* van P.F. van Solt.³ In dit boek wordt onder meer de herkomst van de Regel van Hermes nagegaan. Deze komt al voor in het aan Ptolemaeus toegeschreven *Centiloquium* (Gr. Καταπύ). De Regel van Hermes is dus al zeer oud, en heeft verschillende vormen gehad. De oorsprong blijft echter onduidelijk, zowel wat betreft de geschiedenis ervan, als technisch en esoterisch. Over dit laatste is natuurlijk wel te speculeren, maar dat laten we hier (voorlopig?) graag aan de lezer. ■

Noten

1. E.H. Bailey, *The Prenatal Epoch*, Foulsham & Co, London, 1916
2. Chris Stubbs, *De prenatale epoch en daarna*, in URANIA jg. 99 nr. 1 p. 2-8
3. P.F. van Solt, *De Regel van Hermes*, NAG, 1938